


## 284




On osoitettava, että jana  $DE$  sivun  $AB$  kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on  $\frac{4}{5}$  sivun  $AB$  pituudesta. Pitää siis osoittaa, että

$$\overline{DE} = \frac{4}{5} \overline{AB}.$$

Muodostetaan vektori  $\overline{DE}$ .

$$\begin{aligned} \overline{DE} &= \overline{DC} + \overline{CE} \\ &= \frac{4}{5} \overline{AC} + \frac{4}{5} \overline{CB} \\ &= \frac{4}{5} (\overline{AC} + \overline{CB}) \\ &= \frac{4}{5} \overline{AB} \end{aligned}$$

On siis osoitettu, että  $\overline{DE} = \frac{4}{5} \overline{AB}$ .  $\square$




On osoitettava, että jana  $AR$  janan  $PQ$  kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on kaksinkertainen janan  $PQ$  pituuteen verrattuna. Pitää siis osoittaa, että  $\overline{AR} = 2\overline{PQ}$ .

Muodostetaan vektori  $\overline{AR}$ .

$$\begin{aligned}
 \overline{AR} &= \overline{AB} + \overline{BR} && \text{piste } Q \text{ on pisteiden } B \text{ ja } R \text{ puolivälissä} \\
 &= 2\overline{PB} + 2\overline{BQ} \\
 &= 2(\overline{PB} + \overline{BQ}) \\
 &= 2\overline{PQ}
 \end{aligned}$$

On siis osoitettu, että  $\overline{AR} = 2\overline{PQ}$ .  $\square$



Nelikulmio on suunnikas, jos sen vastakkaiset sivut ovat yhdensuuntaiset. On siis osoitettava, että  $AD \parallel FE$  ja  $AF \parallel DE$ .

Tarkastellaan nelikulmion sivuvektoreita  $\overline{AD}$  ja  $\overline{FE}$ .

$$\overline{AD} = \frac{1}{2} \overline{AB}$$

$$\overline{FE} = \overline{FC} + \overline{CE}$$

$$= \frac{1}{2} \overline{AC} + \frac{1}{2} \overline{CB}$$

$$= \frac{1}{2} \overline{AC} + \frac{1}{2} (\overline{CA} + \overline{AB})$$

$$= \frac{1}{2} \overline{AC} - \frac{1}{2} \overline{AC} + \frac{1}{2} \overline{AB} = \frac{1}{2} \overline{AB}$$

Koska  $\overline{AD} = \overline{FE}$ , niin nelikulmion sivut  $AD$  ja  $FE$  ovat yhdensuuntaiset.

Tarkastellaan vastaavasti nelikulmion sivuvektoreita  $\overline{AF}$  ja  $\overline{DE}$ .

$$\overline{AF} = \frac{1}{2} \overline{AC}$$

$$\overline{DE} = \overline{DB} + \overline{BE}$$


$$= \frac{1}{2} \overline{AB} + \frac{1}{2} \overline{BC}$$

$$= \frac{1}{2} \overline{AB} + \frac{1}{2} (\overline{BA} + \overline{AC})$$

$$= \frac{1}{2} \overline{AB} - \frac{1}{2} \overline{AB} + \frac{1}{2} \overline{AC} = \frac{1}{2} \overline{AC}$$

Koska  $\overline{AF} = \overline{DE}$ , niin myös nelikulmion sivut  $AF$  ja  $DE$  ovat yhdensuuntaiset.

Koska nelikulmion  $ADEF$  vastakkaiset sivut ovat yhdensuuntaiset, nelikulmio  $ADEF$  on suunnikas.  $\square$



Oheisessa nelikulmiossa sivut  $AB$  ja  $DC$  ovat yhdensuuntaiset ja yhtä pitkät, joten  $\overline{AB} = \overline{DC}$ .


Nelikulmio on suunnikas, jos sen vastakkaiset sivut ovat yhdensuuntaiset. On siis osoitettava, että  $AD \parallel BC$ .

Tarkastellaan nelikulmion sivuvektoria  $\overline{BC}$ .

$$\begin{aligned} \overline{BC} &= \overline{BA} + \overline{AD} + \overline{DC} \\ &= -\overline{AB} + \overline{AD} + \overline{DC} & \overline{AB} &= \overline{DC} \\ &= -\overline{DC} + \overline{AD} + \overline{DC} \\ &= \overline{AD} \end{aligned}$$

Koska  $\overline{AD} = \overline{BC}$ , niin myös nelikulmion sivut  $AD$  ja  $BC$  ovat yhdensuuntaiset.

Koska nelikulmion  $ABCD$  vastakkaiset sivut ovat yhdensuuntaiset, nelikulmio  $ABCD$  on suunnikas.  $\square$



Tutkitaan suunnikasta  $ABCD$ . Merkitään lävistäjien leikkauspistettä kirjaimella  $E$ .

Merkitään  $\overline{AE} = s\overline{AC}$  ja  $\overline{BE} = t\overline{BD}$ , missä  $s$  ja  $t$  ovat reaalilukuja. Kertoimien  $s$  ja  $t$  selvittämiseksi tarvitaan vektoriyhtälö, joten esitetään vektori  $\overline{AE}$  kahdella eri tavalla. Valitaan kantavektoreiksi  $\overline{AB}$  ja  $\overline{AD}$ .

$$\begin{aligned}\overline{AE} &= s\overline{AC} \\ &= s(\overline{AB} + \overline{BC}) \\ &= s(\overline{AB} + \overline{AD}) \\ &= s\overline{AB} + s\overline{AD}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overline{AE} &= \overline{AB} + \overline{BE} \\ &= \overline{AB} + t\overline{BD} \\ &= \overline{AB} + t(\overline{BA} + \overline{AD}) \\ &= \overline{AB} + t(-\overline{AB} + \overline{AD}) \\ &= \overline{AB} - t\overline{AB} + t\overline{AD} \\ &= (1-t)\overline{AB} + t\overline{AD}\end{aligned}$$

Muodostetaan yhtälö.

$$\overline{AE} = \overline{AE}$$

$$s\overline{AB} + s\overline{AD} = (1-t)\overline{AB} + t\overline{AD}$$


Koska komponenttiesitys on yksikäsitteinen, saadaan yhtälöpari.

$$\begin{cases} s = 1 - t \\ s = t \end{cases}$$

Yhtälöparin ratkaisuksi saadaan (esim. laskimella)  $s = \frac{1}{2}$  ja  $t = \frac{1}{2}$ .

Siten  $\overline{AE} = s\overline{AC} = \frac{1}{2}\overline{AC}$  ja  $\overline{BE} = t\overline{BD} = \frac{1}{2}\overline{BD}$ .

Siis lävistäjien leikkauspiste  $E$  jakaa molemmat lävistäjät kahteen yhtä suureen osaan, joten lävistäjät puolittavat toisensa.  $\square$



Tutkitaan puolisuunnikasta  $ABCD$ , jossa  $\overline{AB} = 4\overline{DC}$ . Merkitään lävistäjien leikkauspistettä kirjaimella  $E$ .

Merkitään  $\overline{AE} = s\overline{AC}$  ja  $\overline{BE} = t\overline{BD}$ , missä  $s$  ja  $t$  ovat reaalilukuja. Kertoimien  $s$  ja  $t$  selvittämiseksi tarvitaan vektoriytälö, joten esitetään vektori  $\overline{AE}$  kahdella eri tavalla. Valitaan kantavektoreiksi  $\overline{AB}$  ja  $\overline{AD}$ .

$$\begin{aligned}
 \overline{AE} &= s\overline{AC} \\
 &= s(\overline{AD} + \overline{DC}) \\
 &= s\left(\overline{AD} + \frac{1}{4}\overline{AB}\right) \\
 &= s\overline{AD} + \frac{1}{4}s\overline{AB} \\
 &= \frac{1}{4}s\overline{AB} + s\overline{AD}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \overline{AE} &= \overline{AB} + \overline{BE} \\
 &= \overline{AB} + t\overline{BD} \\
 &= \overline{AB} + t(\overline{BA} + \overline{AD}) \\
 &= \overline{AB} + t(-\overline{AB} + \overline{AD}) \\
 &= \overline{AB} - t\overline{AB} + t\overline{AD} \\
 &= (1-t)\overline{AB} + t\overline{AD}
 \end{aligned}$$



Muodostetaan yhtälö.

$$\overline{AE} = \overline{AE}$$

$$\frac{1}{4}s\overline{AB} + s\overline{AD} = (1-t)\overline{AB} + t\overline{AD}$$

Koska komponenttiesitys on yksikäsitteinen, saadaan yhtälöpari.

$$\begin{cases} \frac{1}{4}s = 1 - t \\ s = t \end{cases}$$

Yhtälöparin ratkaisuksi saadaan (esim. laskimella)  $s = \frac{4}{5}$  ja  $t = \frac{4}{5}$ .

Siten  $\overline{AE} = s\overline{AC} = \frac{4}{5}\overline{AC}$  ja  $\overline{BE} = t\overline{BD} = \frac{4}{5}\overline{BD}$ .

Siis lävistäjien leikkauspiste  $E$  jakaa lävistäjän  $AC$  suhteessa 4 : 1 ja lävistäjän  $BD$  samoin suhteessa 4 : 1.


Vastaus Piste  $E$  jakaa molemmat lävistäjät  $AC$  ja  $BD$  suhteessa 4 : 1.

- a) Pisteiden  $A$ ,  $B$  ja  $P$  paikkavektorit ovat  $\overline{OA}$ ,  $\overline{OB}$  ja  $\overline{OP}$ .

Muodostetaan vektori  $\overline{OP}$ .

$$\begin{aligned}
 \overline{OP} &= \overline{OA} + \overline{AP} \\
 &= \overline{OA} + \frac{1}{2}\overline{AB} \\
 &= \overline{OA} + \frac{1}{2}(\overline{AO} + \overline{OB}) \\
 &= \overline{OA} + \frac{1}{2}(-\overline{OA} + \overline{OB}) \\
 &= \overline{OA} - \frac{1}{2}\overline{OA} + \frac{1}{2}\overline{OB} \\
 &= \frac{1}{2}\overline{OA} + \frac{1}{2}\overline{OB} \\
 &= \frac{1}{2}(\overline{OA} + \overline{OB})
 \end{aligned}$$

Siten pisteen  $P$  paikkavektori on puolet päätepisteiden paikkavektorien summasta.  $\square$



b) Käytetään hyväksi a-kohdan tulosta.

Pisteiden  $C$  ja  $D$  paikkavektorit ovat  $\overline{OC} = 3\bar{i} + 2\bar{j} - 4\bar{k}$  ja  $\overline{OD} = -\bar{i} + 8\bar{j} + 10\bar{k}$ .

Paikkavektorien summa on

$$\begin{aligned}\overline{OC} + \overline{OD} &= 3\bar{i} + 2\bar{j} - 4\bar{k} - \bar{i} + 8\bar{j} + 10\bar{k} \\ &= 2\bar{i} + 10\bar{j} + 6\bar{k},\end{aligned}$$

joten janan  $CD$  keskipisteen paikkavektori on

$$\frac{1}{2}(2\bar{i} + 10\bar{j} + 6\bar{k}) = \bar{i} + 5\bar{j} + 3\bar{k}$$

ja keskipiste on  $(1, 5, 3)$ .

Vastaus b)  $(1, 5, 3)$

Piste  $M$  on kolmion  $ABC$  mediaanien leikkauspiste. Tiedetään (ks. esimerkki 4), että pisteen  $M$  paikkavektori on


$\overline{OM} = \frac{1}{3}(\overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OC})$ , missä  $\overline{OA}$ ,  $\overline{OB}$  ja  $\overline{OC}$  ovat pisteiden  $A$ ,  $B$  ja  $C$  paikkavektorit.


Tarkastellaan lauseketta  $\overline{MA} + \overline{MB} + \overline{MC}$ .

$$\begin{aligned} \overline{MA} + \overline{MB} + \overline{MC} &= \overline{MO} + \overline{OA} + \overline{MO} + \overline{OB} + \overline{MO} + \overline{OC} \\ &= 3\overline{MO} + \overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OC} \\ &= -3\overline{OM} + \overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OC} \\ &= -3 \cdot \frac{1}{3}(\overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OC}) + \overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OC} \\ &= -(\overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OC}) + \overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OC} \\ &= -\overline{OA} - \overline{OB} - \overline{OC} + \overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OC} \\ &= \overline{0} \end{aligned}$$

Saatiin siis  $\overline{MA} + \overline{MB} + \overline{MC} = \overline{0}$ .  $\square$

(Yllä laskun ensimmäisessä vaiheessa kukin yhteenlaskettava on kirjoitettu kahden vektorin summana, esim.  $\overline{MA} = \overline{MO} + \overline{OA}$ .)





On osoitettava, että jana  $EF$  on kantasivujen  $AB$  ja  $DC$  suuntainen ja sen pituus on puolet kantasivujen pituuksien summasta. Koska vektorit  $\overline{AB}$  ja  $\overline{DC}$  ovat samansuuntaiset, pitää osoittaa, että  $\overline{EF} = \frac{1}{2}(\overline{AB} + \overline{DC})$ .

Muodostetaan vektori  $\overline{EF}$  kahdella eri tavalla.

$$\begin{aligned}\overline{EF} &= \overline{ED} + \overline{DC} + \overline{CF} \\ &= \frac{1}{2}\overline{AD} + \overline{DC} + \frac{1}{2}\overline{CB}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overline{EF} &= \overline{EA} + \overline{AB} + \overline{BF} \\ &= \frac{1}{2}\overline{DA} + \overline{AB} + \frac{1}{2}\overline{BC}\end{aligned}$$

Lasketaan saadut lausekkeet yhteen.

$$\overline{EF} + \overline{EF} = \frac{1}{2}\overline{AD} + \overline{DC} + \frac{1}{2}\overline{CB} + \left(\frac{1}{2}\overline{DA} + \overline{AB} + \frac{1}{2}\overline{BC}\right)$$

$$2\overline{EF} = \frac{1}{2}\overline{AD} + \overline{DC} + \frac{1}{2}\overline{CB} + \frac{1}{2}\overline{DA} + \overline{AB} + \frac{1}{2}\overline{BC}$$

$$= \frac{1}{2}\overline{AD} + \frac{1}{2}\overline{DA} + \overline{DC} + \frac{1}{2}\overline{CB} + \frac{1}{2}\overline{BC} + \overline{AB}$$


$$= \frac{1}{2}\overline{AD} - \frac{1}{2}\overline{AD} + \overline{DC} - \frac{1}{2}\overline{BC} + \frac{1}{2}\overline{BC} + \overline{AB}$$

$$= \overline{0} + \overline{DC} + \overline{0} + \overline{AB}$$

$$= \overline{DC} + \overline{AB}$$

$$= \overline{AB} + \overline{DC}$$

Saadaan siis  $\overline{EF} = \frac{1}{2}(\overline{AB} + \overline{DC})$ .  $\square$



On osoitettava, että lävistäjien keskipisteet yhdistävä jana  $EF$  on kantasivujen  $AB$  ja  $DC$  suuntainen. Koska kantasivut  $AB$  ja  $DC$  ovat yhdensuuntaiset, riittää osoittaa esimerkiksi, että  $EF \parallel AB$ . Vektorien avulla ilmaistuna on siis oltava olemassa jokin nollasta eroava reaaliluku  $r$  siten, että  $\overline{EF} = r\overline{AB}$ .

Koska kantasivut  $AB$  ja  $DC$  ovat yhdensuuntaiset, mutta niiden pituuksien suhdetta ei tiedetä, merkitään  $\overline{DC} = t\overline{AB}$ , missä  $t$  on nollasta eroava reaaliluku.

Muodostetaan vektori  $\overline{EF}$  kahdella eri tavalla.

$$\overline{EF} = \overline{EA} + \overline{AB} + \overline{BF} = \frac{1}{2}\overline{CA} + \overline{AB} + \frac{1}{2}\overline{BD}$$

$$\begin{aligned} \overline{EF} &= \overline{EC} + \overline{CD} + \overline{DF} \\ &= \frac{1}{2}\overline{AC} - \overline{DC} + \frac{1}{2}\overline{DB} \\ &= \frac{1}{2}\overline{AC} - t\overline{AB} + \frac{1}{2}\overline{DB} \end{aligned}$$


Lasketaan saadut lausekkeet yhteen.

$$\begin{aligned}
 \overline{EF} + \overline{EF} &= \frac{1}{2}\overline{CA} + \overline{AB} + \frac{1}{2}\overline{BD} + \left(\frac{1}{2}\overline{AC} - t\overline{AB} + \frac{1}{2}\overline{DB}\right) \\
 2\overline{EF} &= \frac{1}{2}\overline{CA} + \overline{AB} + \frac{1}{2}\overline{BD} + \frac{1}{2}\overline{AC} - t\overline{AB} + \frac{1}{2}\overline{DB} \\
 &= \frac{1}{2}\overline{CA} + \frac{1}{2}\overline{AC} + \overline{AB} - t\overline{AB} + \frac{1}{2}\overline{BD} + \frac{1}{2}\overline{DB} \\
 &= -\frac{1}{2}\overline{AC} + \frac{1}{2}\overline{AC} + (1-t)\overline{AB} + \frac{1}{2}\overline{BD} - \frac{1}{2}\overline{BD} \\
 &= \overline{0} + (1-t)\overline{AB} + \overline{0} \\
 &= (1-t)\overline{AB}
 \end{aligned}$$

Saadaan siis  $\overline{EF} = \frac{1-t}{2}\overline{AB}$  eli vaadittua muotoa  $\overline{EF} = r\overline{AB}$  oleva lauseke. Siten jana  $EF$  on kantasivun  $AB$  (ja myös  $DC$ ) suuntainen.  $\square$

HUOM. Yllä yhtälössä  $\overline{EF} = r\overline{AB}$  luvun  $r$  pitää olla nolasta eroava, joten yhtälössä  $\overline{EF} = \frac{1-t}{2}\overline{AB}$  luku  $t$  ei saa olla 1. Tämä onkin tilanne, sillä jos  $t=1$ , niin  $\overline{DC} = t\overline{AB} = \overline{AB}$  ja puolisuunnikas on itse asiassa suunnikas. Tällöin lävistäjien keskipisteet  $E$  ja  $F$  yhtyvät ja jana  $EF$  typistyy pisteeksi.





Oheisen nelikulmion  $ABCD$  sivujen keskipisteet on yhdistetty peräkkäin siten, että on muodostunut nelikulmio  $EFGH$ . On osoitettava, että nelikulmio  $EFGH$  on suunnikas.

Nelikulmio on suunnikas, jos sen vastakkaiset sivut ovat yhdensuuntaiset. On siis osoitettava, että  $EF \parallel HG$  ja  $EH \parallel FG$ .

Tarkastellaan nelikulmion  $EFGH$  sivuvektoreita  $\overline{EF}$  ja  $\overline{HG}$ .

$$\overline{EF} = \overline{EA} + \overline{AF}$$

$$= \frac{1}{2}\overline{DA} + \frac{1}{2}\overline{AB}$$

$$= \frac{1}{2}(\overline{DA} + \overline{AB}) = \frac{1}{2}\overline{DB}$$

$$\overline{HG} = \overline{HC} + \overline{CG}$$

$$= \frac{1}{2}\overline{DC} + \frac{1}{2}\overline{CB}$$

$$= \frac{1}{2}(\overline{DC} + \overline{CB}) = \frac{1}{2}\overline{DB}$$

Koska  $\overline{EF} = \overline{HG}$ , niin nelikulmion sivut  $EF$  ja  $HG$  ovat yhdensuuntaiset.

Tarkastellaan vastaavasti nelikulmion  $EFGH$  sivuvektoreita  $\overline{EH}$  ja  $\overline{FG}$ .

$$\overline{EH} = \overline{ED} + \overline{DH}$$

$$= \frac{1}{2}\overline{AD} + \frac{1}{2}\overline{DC}$$

$$= \frac{1}{2}(\overline{AD} + \overline{DC}) = \frac{1}{2}\overline{AC}$$

$$\overline{FG} = \overline{FB} + \overline{BG}$$


$$= \frac{1}{2}\overline{AB} + \frac{1}{2}\overline{BC}$$

$$= \frac{1}{2}(\overline{AB} + \overline{BC}) = \frac{1}{2}\overline{AC}$$

Koska  $\overline{EH} = \overline{FG}$ , niin myös nelikulmion sivut  $EH$  ja  $FG$  ovat yhdensuuntaiset.

Koska nelikulmion  $EFGH$  vastakkaiset sivut ovat yhdensuuntaiset, nelikulmio  $EFGH$  on suunnikas.  $\square$

HUOM. Tehtävän 287 tuloksen nojalla riittäisi osoittaa, että  $\overline{EF} = \overline{HG}$  tai  $\overline{EH} = \overline{FG}$ .



Sijoitetaan särmiö koordinaatistoon siten, että kärki  $D$  on origossa ja kärjet  $A$ ,  $C$  ja  $H$  positiivisilla koordinaattiakseleilla.

Merkitään kuution särmän pituutta kirjaimella  $a$  sekä kuution muita pisteitä kuvan mukaisesti. Pisteet  $I$ ,  $J$ ,  $K$  ja  $L$  ovat särmien keskipisteitä.

- a) On osoitettava, että nelikulmion  $IJKL$  vastakkaiset sivut ovat yhdensuuntaiset.

Muodostetaan vektorit  $\overline{IJ}$ ,  $\overline{JK}$ ,  $\overline{IL}$  ja  $\overline{LK}$ .

$$\begin{aligned}\overline{IJ} &= \overline{IB} + \overline{BC} + \overline{CJ} \\ &= \frac{1}{2}\overline{AB} + \overline{BC} + \frac{1}{2}\overline{CG}\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2}a\bar{j} - a\bar{i} + \frac{1}{2}a\bar{k}$$

$$= -a\bar{i} + \frac{1}{2}a\bar{j} + \frac{1}{2}a\bar{k}$$

$$\overline{JK} = \overline{JG} + \overline{GK}$$

$$= \frac{1}{2}\overline{CG} + \frac{1}{2}\overline{GH}$$

$$= \frac{1}{2}a\bar{k} - \frac{1}{2}a\bar{j}$$

$$= -\frac{1}{2}a\bar{j} + \frac{1}{2}a\bar{k}$$

$$\overline{IL} = \overline{IA} + \overline{AL}$$

$$= \frac{1}{2}\overline{BA} + \frac{1}{2}\overline{AE}$$

$$= -\frac{1}{2}a\bar{j} + \frac{1}{2}a\bar{k}$$

$$\overline{LK} = \overline{LE} + \overline{EH} + \overline{HK}$$

$$= \frac{1}{2}\overline{AE} + \overline{EH} + \frac{1}{2}\overline{HG}$$

$$= \frac{1}{2}a\bar{k} - a\bar{i} + \frac{1}{2}a\bar{j}$$

$$= -a\bar{i} + \frac{1}{2}a\bar{j} + \frac{1}{2}a\bar{k}$$

Koska  $\overline{IJ} = \overline{LK}$  ja  $\overline{JK} = \overline{IL}$ , niin nelikulmion  $IJKL$  vastakkaiset sivut ovat yhdensuuntaiset.  $\square$

- b) Nelikulmio  $IJKL$  on suorakulmio, jos vierekkäiset sivut ovat toisiaan vastaan kohtisuorassa eli jos vastaavien sivuvektorien pistetulot ovat nollia. Lasketaan vierekkäisten sivuvektorien pistetulot.


$$\begin{aligned}\overline{IJ} \cdot \overline{JK} &= (-a\bar{i} + \frac{1}{2}a\bar{j} + \frac{1}{2}a\bar{k}) \cdot (-\frac{1}{2}a\bar{j} + \frac{1}{2}a\bar{k}) \\ &= (-a\bar{i} + \frac{1}{2}a\bar{j} + \frac{1}{2}a\bar{k}) \cdot (0\bar{i} - \frac{1}{2}a\bar{j} + \frac{1}{2}a\bar{k}) \\ &= -a \cdot 0 + \frac{1}{2}a \cdot (-\frac{1}{2}a) + \frac{1}{2}a \cdot (\frac{1}{2}a) \\ &= 0 - \frac{1}{4}a^2 + \frac{1}{4}a^2 = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overline{IJ} \cdot \overline{IL} &= (-a\bar{i} + \frac{1}{2}a\bar{j} + \frac{1}{2}a\bar{k}) \cdot (-\frac{1}{2}a\bar{j} + \frac{1}{2}a\bar{k}) \\ &= \overline{IJ} \cdot \overline{JK} \\ &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overline{IL} \cdot \overline{LK} &= (-\frac{1}{2}a\bar{j} + \frac{1}{2}a\bar{k}) \cdot (-a\bar{i} + \frac{1}{2}a\bar{j} + \frac{1}{2}a\bar{k}) \\ &= (0\bar{i} - \frac{1}{2}a\bar{j} + \frac{1}{2}a\bar{k}) \cdot (-a\bar{i} + \frac{1}{2}a\bar{j} + \frac{1}{2}a\bar{k}) \\ &= 0 \cdot (-a) - \frac{1}{2}a \cdot (\frac{1}{2}a) + \frac{1}{2}a \cdot (\frac{1}{2}a) \\ &= 0 - \frac{1}{4}a^2 + \frac{1}{4}a^2 = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overline{JK} \cdot \overline{LK} &= \left(-\frac{1}{2}a\bar{j} + \frac{1}{2}a\bar{k}\right) \cdot \left(-a\bar{i} + \frac{1}{2}a\bar{j} + \frac{1}{2}a\bar{k}\right) \\ &= \overline{IL} \cdot \overline{LK} \\ &= 0\end{aligned}$$

Koska vierekkäisten sivuvektorien pistetulot ovat nollia, nelikulmio  $IJKL$  on suorakulmio.  $\square$



- a) Nelikulmio on neljäkäs, jos kaikki sen sivut ovat yhtä pitkät. On osoitettava, että neljäkkään lävistäjät ovat toisiaan vastaan kohtisuorassa.

Tarkastellaan neljäkästä  $ABCD$ . Esitetään lävistäjävektorit  $\overline{AC}$  ja  $\overline{BD}$  vektorien  $\overline{AB}$  ja  $\overline{AD}$  avulla.

$$\begin{aligned}\overline{AC} &= \overline{AB} + \overline{BC} & \overline{BD} &= \overline{BA} + \overline{AD} \\ &= \overline{AB} + \overline{AD} & &= -\overline{AB} + \overline{AD}\end{aligned}$$


Lasketaan lävistäjävektorien pistetulo.

$$\begin{aligned}\overline{AC} \cdot \overline{BD} &= (\overline{AB} + \overline{AD}) \cdot (-\overline{AB} + \overline{AD}) \\ &= \overline{AB} \cdot (-\overline{AB}) + \overline{AB} \cdot \overline{AD} + \overline{AD} \cdot (-\overline{AB}) + \overline{AD} \cdot \overline{AD} \\ &= -\overline{AB} \cdot \overline{AB} + \overline{AB} \cdot \overline{AD} - \overline{AD} \cdot \overline{AB} + \overline{AD} \cdot \overline{AD} \\ &= -|\overline{AB}|^2 + \overline{AB} \cdot \overline{AD} - \overline{AB} \cdot \overline{AD} + |\overline{AD}|^2 \\ &= -|\overline{AB}|^2 + |\overline{AD}|^2 \\ &= 0\end{aligned}$$

Viimeinen vaihe seuraa siitä, että neljäkkään sivuina vektorit  $\overline{AB}$  ja  $\overline{AD}$  ovat yhtä pitkät eli  $|\overline{AB}| = |\overline{AD}|$ .


Koska lävistäjävektorien pistetulo on nolla, lävistäjät ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan.  $\square$

- b) Kuten kuvasta nähdään, nelikulmio ei aina ole neljäkäs, vaikka sen lävistäjät olisivatkin toisiaan vastaan kohtisuorassa.



Vastaus b) ei ole





Kehäkulma  $B$  on suora, kun vektorit  $\overline{BA}$  ja  $\overline{BC}$  ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan eli täsmälleen silloin, kun niiden pistetulo on nolla.

Määritetään vektorit  $\overline{BA}$  ja  $\overline{BC}$  keskipisteestä  $K$  lähtevien vektorien  $\overline{KB}$  ja  $\overline{KC}$  avulla. Nämä kelpaavat kantavektoreiksi, koska ne ovat erisuuntaiset ja kumpikaan ei ole nollavektori.

$$\overline{BA} = -\overline{KB} - \overline{KC}$$


$$\overline{BC} = -\overline{KB} + \overline{KC}$$

Lasketaan vektorien  $\overline{BA}$  ja  $\overline{BC}$  pistetulo.

$$\begin{aligned}\overline{BA} \cdot \overline{BC} &= (-\overline{KB} - \overline{KC}) \cdot (-\overline{KB} + \overline{KC}) \\ &= -\overline{KB} \cdot (-\overline{KB}) - \overline{KB} \cdot \overline{KC} - \overline{KC} \cdot (-\overline{KB}) - \overline{KC} \cdot \overline{KC} \\ &= \overline{KB} \cdot \overline{KB} - \overline{KB} \cdot \overline{KC} + \overline{KC} \cdot \overline{KB} - \overline{KC} \cdot \overline{KC} \\ &= |\overline{KB}|^2 - \overline{KB} \cdot \overline{KC} + \overline{KB} \cdot \overline{KC} - |\overline{KC}|^2 \\ &= |\overline{KB}|^2 - |\overline{KC}|^2 \\ &= 0\end{aligned}$$

Viimeinen vaihe seuraa siitä, että (puoli)ympyrän säteinä vektorit  $\overline{KB}$  ja  $\overline{KC}$  ovat yhtä pitkät eli  $|\overline{KB}| = |\overline{KC}|$ .

Koska pistetulo  $\overline{BA} \cdot \overline{BC} = 0$ , niin vektorit  $\overline{BA}$  ja  $\overline{BC}$  ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan ja kehäkulma  $B$  on suora.  $\square$



Tutkitaan oheisen kuvan suunnikasta  $ABCD$ . Merkitään  $\overline{AP} = s\overline{AQ}$  ja  $\overline{BP} = t\overline{BR}$ , missä  $s$  ja  $t$  ovat reaalityyppisiä lukuja. Kertoimien  $s$  ja  $t$  selvittämiseksi tarvitaan vektoryhtälö, joten esitetään vektori  $\overline{AP}$  kahdella eri tavalla. Valitaan kantavektoreiksi  $\overline{AB}$  ja  $\overline{AD}$ .

$$\begin{aligned}\overline{AP} &= s\overline{AQ} \\ &= s(\overline{AB} + \overline{BQ}) \\ &= s\left(\overline{AB} + \frac{1}{3}\overline{BC}\right) \\ &= s\left(\overline{AB} + \frac{1}{3}\overline{AD}\right) \\ &= s\overline{AB} + \frac{1}{3}s\overline{AD}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overline{AP} &= \overline{AB} + \overline{BP} \\ &= \overline{AB} + t\overline{BR} \\ &= \overline{AB} + t(\overline{BA} + \overline{AD} + \overline{DR}) \\ &= \overline{AB} + t(-\overline{AB} + \overline{AD} + \frac{1}{4}\overline{DC}) \\ &= \overline{AB} + t(-\overline{AB} + \overline{AD} + \frac{1}{4}\overline{AB}) \\ &= \overline{AB} - t\overline{AB} + t\overline{AD} + \frac{1}{4}t\overline{AB} \\ &= (1 - \frac{3}{4}t)\overline{AB} + t\overline{AD}\end{aligned}$$

Muodostetaan yhtälö.

$$\overline{AP} = \overline{AP}$$

$$s\overline{AB} + \frac{1}{3}s\overline{AD} = \left(1 - \frac{3}{4}t\right)\overline{AB} + t\overline{AD}$$

Koska komponenttiesitys on yksikäsitteinen, saadaan yhtälöpari.

$$\begin{cases} s = 1 - \frac{3}{4}t \\ \frac{1}{3}s = t \end{cases}$$

Yhtälöparin ratkaisuksi saadaan (esim. laskimella)  $s = \frac{4}{5}$  ja  $t = \frac{4}{15}$ .

Siten  $\overline{AP} = s\overline{AQ} = \frac{4}{5}\overline{AQ}$  ja  $\overline{BP} = t\overline{BR} = \frac{4}{15}\overline{BR}$ .


Siis leikkauspiste  $P$  jakaa

a) janan  $AQ$  suhteessa  $4 : 1$  ( $\frac{4}{5}$  ja  $\frac{1}{5}$ )

ja

b) janan  $BR$  suhteessa  $4 : 11$  ( $\frac{4}{15}$  ja  $\frac{11}{15}$ ).

Vastaus a) suhteessa  $4 : 1$   
b) suhteessa  $4 : 11$



Tutkitaan puolisuunnikasta  $ABCD$ . Koska sivujen  $AB$  ja  $DC$  pituuksien suhde on  $m : n$ , niin  $\overline{AB} = \frac{m}{n}\overline{DC}$ . Merkitään lävistäjien leikkauspistettä kirjaimella  $P$ .

Merkitään  $\overline{AP} = s\overline{AC}$  ja  $\overline{BP} = t\overline{BD}$ , missä  $s$  ja  $t$  ovat reaalilukuja. Kertoimien  $s$  ja  $t$  selvittämiseksi tarvitaan vektoriytälö, joten esitetään vektori  $\overline{AP}$  kahdella eri tavalla. Valitaan kantavektoreiksi  $\overline{AB}$  ja  $\overline{AD}$ .

$$\begin{aligned}\overline{AP} &= s\overline{AC} \\ &= s(\overline{AD} + \overline{DC}) \\ &= s\left(\overline{AD} + \frac{n}{m}\overline{AB}\right) \\ &= s\overline{AD} + \frac{n}{m}s\overline{AB} \\ &= \frac{n}{m}s\overline{AB} + s\overline{AD}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overline{AP} &= \overline{AB} + \overline{BP} \\ &= \overline{AB} + t\overline{BD} \\ &= \overline{AB} + t(\overline{BA} + \overline{AD}) \\ &= \overline{AB} + t(-\overline{AB} + \overline{AD}) \\ &= \overline{AB} - t\overline{AB} + t\overline{AD} \\ &= (1-t)\overline{AB} + t\overline{AD}\end{aligned}$$

Muodostetaan yhtälö.

$$\overline{AP} = \overline{AP}$$

$$\frac{n}{m}s\overline{AB} + s\overline{AD} = (1-t)\overline{AB} + t\overline{AD}$$

Koska komponenttiesitys on yksikäsitteinen, saadaan yhtälöpari.


$$\begin{cases} \frac{n}{m}s = 1-t \\ s = t \end{cases}$$

Yhtälöparin ratkaisuksi saadaan (esim. laskimella)  $s = \frac{m}{m+n}$  ja

$$t = \frac{m}{m+n}.$$

Siten  $\overline{AP} = s\overline{AC} = \frac{m}{m+n}\overline{AC}$  ja  $\overline{BP} = t\overline{BD} = \frac{m}{m+n}\overline{BD}$ .

Koska siis lävistäjien leikkauspisteen  $P$  toisella puolella on lävistäjästä  $\frac{m}{m+n}$  osaa, jää toiselle puolelle  $\frac{n}{m+n}$  osaa, joten leikkauspiste  $P$  jakaa lävistäjät  $AC$  ja  $BD$  suhteessa  $m : n$ .  $\square$



Tetraedrin kärkipisteiden paikkavektorit ovat  $\overline{OA}$ ,  $\overline{OB}$ ,  $\overline{OC}$  ja  $\overline{OD}$ .

Käytetään hyväksi tehtävän 290 a-kohdan tulosta: janan keskipisteen paikkavektori on puolet janan päätepisteiden paikkavektorien summasta.

Siten pisteen  $E$  paikkavektori  $\overline{OE}$  on

$$\overline{OE} = \frac{1}{2}(\overline{OA} + \overline{OB}).$$

Vastaavasti pisteen  $F$  paikkavektori  $\overline{OF}$  on

$$\overline{OF} = \frac{1}{2}(\overline{OC} + \overline{OD}).$$

Lopuksi pisteen  $P$  paikkavektoriksi  $\overline{OP}$  saadaan

$$\begin{aligned}\overline{OP} &= \frac{1}{2}(\overline{OE} + \overline{OF}) \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}(\overline{OA} + \overline{OB}) + \frac{1}{2}(\overline{OC} + \overline{OD})\right) \\ &= \frac{1}{4}(\overline{OA} + \overline{OB}) + \frac{1}{4}(\overline{OC} + \overline{OD}) \\ &= \frac{1}{4}(\overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OC} + \overline{OD}).\end{aligned}$$

Tulos tarkoittaa, että pisteen  $P$  paikkavektori on tetraedrin kärkipisteiden paikkavektorien keskiarvo. Koska saadussa lausekkeessa kärkipisteet  $A$ ,  $B$ ,  $C$  ja  $D$  ovat tasaveroisessa asemassa, voidaan päätellä, että sama piste  $P$  saataisiin tetraedrin minkä tahansa vastakkaisten särmien keskipisteiden yhdysjanan keskipisteenä. Kaikki kyseiset yhdysjanat kulkevat siis saman pisteen  $P$  kautta.


Kolmion painopisteen (eli mediaanien leikkauspisteen)  $M$  paikkavektorille  $\overline{OM}$  saatiin esimerkissä 4 tulos

$$\overline{OM} = \frac{1}{3}(\overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OC}).$$
 Tässä tehtävässä saatu tulos on kolmiota

koskevan tuloksen ilmeinen yleistys, joten piste  $P$  voidaan ymmärtää tetraedrin painopisteeksi.

Vastaus  $\overline{OP} = \frac{1}{4}(\overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OC} + \overline{OD})$ . Piste  $P$  on tetraedrin painopiste.





Sijoitetaan tetraedri koordinaatistoon siten, että huippu  $D$  on origossa ja pohjakolmion kärjet  $A$ ,  $B$  ja  $C$  sijaitsevat kuvan mukaisesti. Piste  $M$  on pohjakolmion  $ABC$  mediaanien leikkauspiste.

(On helppo vakuuttua, että kyseinen tetraedri on säännöllinen eli kaikki sen särmät ovat yhtä pitkät. Esim. särmävektori

$\overline{DA} = a\vec{i} + a\vec{j}$ , joten särmän pituus on

$$|\overline{DA}| = \sqrt{a^2 + a^2 + 0^2} = \sqrt{2a^2} = \sqrt{2}a. \text{ Särmävektori } \overline{AB} = -a\vec{i} + a\vec{k},$$

joten särmän pituus on  $|\overline{AB}| = \sqrt{(-a)^2 + 0^2 + a^2} = \sqrt{2}a$  ja samoin muille särmille.)

On osoitettava, että pohjakolmion  $ABC$  mediaanien leikkauspiste  $M$  ja tetraedrin huipun  $D$  välinen vektori on kohtisuorassa pohjakolmion mediaanivektoria vastaan. Muodostetaan kyseiset vektorit ja lasketaan niiden pistetulo.

Mediaanien leikkauspisteen  $M$  paikkavektorille  $\overline{OM}$  saatiin esimerkissä 4 tulos  $\overline{OM} = \frac{1}{3}(\overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OC})$ , joten nyt

$$\begin{aligned}\overline{OM} &= \frac{1}{3}((a\bar{i} + a\bar{j}) + (a\bar{j} + a\bar{k}) + (a\bar{i} + a\bar{k})) \\ &= \frac{1}{3}(2a\bar{i} + 2a\bar{j} + 2a\bar{k}) \\ &= \frac{2a}{3}\bar{i} + \frac{2a}{3}\bar{j} + \frac{2a}{3}\bar{k}\end{aligned}$$

eli pisteeksi  $M$  saadaan  $M(\frac{2a}{3}, \frac{2a}{3}, \frac{2a}{3})$ .

Tetraedrin huipun  $D$  ja mediaanien leikkauspisteen  $M$  välinen vektori on  $\overline{DM} = \overline{OM} = \frac{2a}{3}\bar{i} + \frac{2a}{3}\bar{j} + \frac{2a}{3}\bar{k}$ , sillä piste  $D$  sijaitsee origossa.

Mediaanivektoreita on kolme, mutta koska tilanne on nyt symmetrinen, voidaan tarkastella vain yhtä mediaanivektoria.

Valitaan vektoriksi  $\overline{AM}$ . Piste  $A$  on  $(a, a, 0)$ , joten

$$\begin{aligned}\overline{AM} &= (\frac{2a}{3} - a)\bar{i} + (\frac{2a}{3} - a)\bar{j} + (\frac{2a}{3} - 0)\bar{k} \\ &= -\frac{a}{3}\bar{i} - \frac{a}{3}\bar{j} + \frac{2a}{3}\bar{k}.\end{aligned}$$

Lasketaan vektorien  $\overline{DM}$  ja  $\overline{AM}$  pistetulo.

$$\begin{aligned}\overline{DM} \cdot \overline{AM} &= \left(\frac{2a}{3}\overline{i} + \frac{2a}{3}\overline{j} + \frac{2a}{3}\overline{k}\right) \cdot \left(-\frac{a}{3}\overline{i} - \frac{a}{3}\overline{j} + \frac{2a}{3}\overline{k}\right) \\ &= \frac{2a}{3} \cdot \left(-\frac{a}{3}\right) + \frac{2a}{3} \cdot \left(-\frac{a}{3}\right) + \frac{2a}{3} \cdot \frac{2a}{3} \\ &= -\frac{2a^2}{9} - \frac{2a^2}{9} + \frac{4a^2}{9} = 0\end{aligned}$$

Pistetulo on nolla, joten vektorit ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan.

□