

	Hepatiitti A	Hepatiitti B	Hepatiitti C
Aiheuttaja ja itämisaika	hepatiitti A-virus n. 1 kk	hepatiitti B-virus n. 2-3 kk	hepatiitti C-virus n. 2-3 kk
Yleisimmät tartuntatavat	Viruksen saastuttaman ruuan ja juoman välityksellä. Käsien kautta.	Seksikontakti, huumeneula, äidistä lapseen synnytyksessä.	Pääasiassa veren välityksellä (huumeneulat).
Oireet	Pahoinvointi, ripuli, kuume. Myöhemmin ihon ja silmien keltaisuus (maksatulehdus). Pikkulapsilla tauti on usein oireeton tai vähäoireinen.	Pahoinvointi, ripuli, kuume, nivelsäryt, keltaisuus. Osa sairastuneista on oireettomia (mutta tartuttavat silti tautia eteenpäin).	Monet ovat oireettomia, iho kellastuu vain joillakin.
Hoito ja paraneminen	Lepo, paranee itsestään (voi viedä viikkoja). Sairastaminen antaa immuniteetin (= vastustuskyvyn).	Lepo, suurin osa paranee itsestään. Osalla tauti kuitenkin kroonistuu ja voi johtaa myöhemmin maksakirroosiin tai -syöpään. Sairastaminen antaa immuniteetin.	Osa paranee, mutta useimmiten (80%) tauti kroonistuu ja voi myöhemmin johtaa maksakirroosiin tai -syöpään. Sairastaminen ei anna immuniteettia.
Rokote	On. Otetaan kahdessa erässä. (n. 2 x 50 e)	On. Saatavilla on myös yhdistelmärokote hepatiitti A:ta ja B:tä vastaan (n. 3 x 70 e)	Ei ole.
Uusia tapauksia Suomessa/v	v. 2020: 12	v. 2020: 4	v. 2020: 1118