

Kasvun ja osallisuuden edistäminen

Voitte tuoda tänne vastauksia tehtäviin ja kommentoida tuotoksia

TUIJAERAMIES 15.10.2020 11.29

NIMETÖN 23.02.2021 07.09

Virtsatietulehdus

Virtsatietulehdus on bakteerien aiheuttama infektio, jonka aiheuttaa yleensä escherichiacolibakteeri. Lasten virtsatietulehdukset edellyttävät aina huolellista antibioottihoitoa ja sen jälkeistä seurantaa.Se ei tartu ihmisestä toiseen. Oireet: kirvely virtsatessa, tiheytnyt virtsaamistarve, alavatsakipu, usein kuumeilu, toistuvat wc käynnit, joskus yökastelu. Muutoksista heti lääkäriin. Hoito: Lääkärissä otetaan virtsanäyte. Jos pelkkää kuumetta, ripulia tai oksentelua, niin virtsanäyte silloinkin herkästi. Omahoitona voi juoda happamia mehuja.

NIMETÖN 23.02.2021 07.17

Äkilliset suolistotulehdukset

Suolistotulehdus (gastroenteriitti) on tavallisesti viruksen tai joissakin tapauksissa bakteerin aiheuttama ruoansulatusjärjestelmän tulehdus.

- Oireet
- oksentelu
 - ripuli
 - vatsakipu ja vatsakrampit
 - nestehukka vakavimmissa tapauksissa
 - kuume
 - väsymys
 - lihaskipu

- Miten hoidetaan
- nesteytys (lapselle mieluiten mehu tai maito)
 - nesteet pienissä erissä jolloin oksennuksen vaara on pienempi
 - ei runsaasti sokeroituja juomia
 - normaali ruokavalio
 - lisää probiootteja
 - joissakin tapauksessa voidaan hoitaa antibioottien ja kouristuksen vastaisten lääkkeiden avulla.
 - ripulijuoma osmosal novum jota saa apteekista ilman reseptiä

NIMETÖN 23.02.2021 06.53

Hinkuyskä

Tavallisesta yskästä eroava yskä sillä oireena on tyypillisesti useita viikkoja kestävä puuskittainen tikahduttava yskä.

- Oireet
- Maakuulla olessa yskänpuuskat pahenevat ja niistä voi seurata limaistaoksennusta. Sisäänhengitys on vaikeeta sillä yskiminen on niin tiheää. Hyvin pienellä lapsella voi olla hengenvaarallinen.

NIMETÖN 23.02.2021 07.10

Alahengitystieinfektiot

Lasten keuhkokuume

Noin 3.5%–4% alle 5 vuotiaista ja n.1.5% yli 5-vuotiaista lapsista sairastuu vuodessa keuhkokuumeeseen.

Lasten keuhkokuumeen aiheuttajat

Keuhkokuumeen keiskisimpiä aiheuttajia ovat virukset ja bakteerit.

Virukset aiheuttavat yhden kolmanneksen, bakteerit yhden kolmanneksen. Viruksista RSV-, rino-, parainfluenssa-, metpneumo-, ja bokavirus ovat yleisimpiä. Bakteereista yleisimpiä ovat pneumokokki ja mykoplasma.

Lasten keuhkokuumeen oireet

Keuhkokuumeen oireet voivat olla yskä, hengenahdistus, kuume, tihentynyt hengitystaajuus ja alennut yleistila. Keuhkokuume voi myös aiheuttaa rintakehässä kipua sekä hengityksen vinkumista. Keuhkokuumeen oireet ovat samanlaisia, kuin muissa alahengitystieinfektioissa, joten keuhkokuume tulee erottaa muista taudeista.

NIMETÖN 23.02.2021 06.56

Alahengitystieinfektiot

Hengitysiteinfektio voi ilmetä nuhana, yskänä tai kurkkukipuna. Joskus siihen liittyy kuumeilua. oireet kestävät 1-2 viikkoa. Muita oireita: kuinka pirteä lapsi on, kuinka hän syö, onko hänellä kipuja.

NIMETÖN 23.02.2021 07.02

Hinkuyskä

Erittäin tarttuva bakteerin aieuttama infektio. Tauti alkaa yleensä lievillä flunssan oireilla ja noin viikon kuluttua alkaa rajut yskänpuuskat.

NIMETÖN 23.02.2021 07.35

Alahengitysinfektiot

Hoito:Antibioottikuuri,alle 6kk hoidetaan sairaalassa, mikäli avohoidossa tila ei parane kahden vuorokauden kuluessa, aloitetaan hoito sairaalassa.

NIMETÖN 23.02.2021 07.07

Äkilliset suolistotulehdukset

Miten ripulipotilaan vointia seurataan?

- Seuraa kuinka paljon oksentelua ja ripulia esiintyy
- Kuinka paljon lapsi päivän mittaan juo ja kuinka paljon tästä suunnilleen tulee oksennuksen mukana takaisin? Usein on syytä pitää kirjaa juomisista ja syömisistä
- Jos lapsen paino selvästi putoaa on syytä kääntyä lääkärin puoleen
- Kuinka paljon lapsi virtsaa? Jos lapsi ei esimerkiksi päivän aikana lainkaan kastele vaippoja tai käy WC:ssä, hänellä on nestevajausta ja vanhempien on syytä ottaa yhteys lääkäriin
- Mikä on lapsen yleisvointi? Leikkiikö hän normaalisti vai onko väsynyt? Onko kuumetta runsaasti? Onko suu kuiva, ovatko silmät kuopalla? Jos tällaisia merkkejä ilmaantuu, on käännyttävä lääkärin puoleen

NIMETÖN 23.02.2021 07.18

Silmän sidekalvotulehdus

Bakteerien, viruksen tai sienen aiheuttama allerginen reaktio tai mekaanisen ärsytyksen, kuivasilmäisyyden tai epäpuhtauksien aiheuttama allerginen reaktio.Oireet: Kellertävä erite,rähmiminen, silmän punoitus ja kirvely. Hoito:Pienemmillä lapsilla sairaalassa tehokkaat suonensisäiset antibiootit. Leikki-ikäisillä ja isommilla lapsilla suun kautta anettavat lääkkeet, jos yleisvointi hyvä.Happamat mehut saattavat auttaa tulehdukseen myös.

NIMETÖN 23.02.2021 07.07

Hinkuyskä

Keinoja oireiden lievittämiseksi. Sängyn pääty olisi hyvä korottaa yskimisen ja hengityksen helpottamiseksi. Lapselle on hyvä tarjota paljon juotavaa esim. mehua. Hinkuyskää voidaan yrittää hoitaa antibiooteilla mutta usein yskä lähtee vain yskimällä.

NIMETÖN 23.02.2021 07.10

Äkilliset suolistotulehdukdet

Milloin lääkäriin...

- Kun lapsi on alle puolivuotias
- Ripuli tai oksentelu on yhtämittaista.
- Kotihoito ei onnistu (lapsi ei juo tai oksentaa kaiken).
- Ulosteeassa on verta.
- Lapsi väsättää.
- Ripulointi jatkuu yli 3 vuorokautta.
- Punnituksen perusteella paino laskee.
- Ripuliin liittyy korkea kuume (yli 39 °C).
- Ripulitartunta on saatu etelänmatkalla.

NIMETÖN 23.02.2021 07.15

Kuumekouristus

Korkea kuume lapsella voi aiheuttaa 0,5-6 vuoden iässä kuumekouristuksia.

- Oireet
- tajuttomuus
 - lihasten jäykistyminen
 - nykiminen
 - velttous
 - sekavuus
 - katseen harhailu

NIMETÖN 23.02.2021 07.18

Kuumekouristus

- Enisapu
- älä estä kouristuksia, huolehdi ettei lapsi satuta itseään
 - varmista hengitys ja käännä kylkiasentoon
 - jos kohtaUS ei mene nopeasti ohi soita 112

NIMETÖN 23.02.2021 07.22

Kuumekouristus

Hoidetaan antamalla kuumeen alentavaa lääkettä. Jos lapselle on määrätty kouristuksiin lääke anna lapselle se. Tajuttomuus-kouristuskohtauksista normaalisti toipunut lapsi ei tarvitse jatkotutkimuksia.
