



Lääkitys ruuansulatuskanavaan

Riina Lindström

- Suun kautta, suuonteloon, peräsuoleen, PEG-letkun tai muun ruokintaletkun kautta mahalaukkuun tai ohutsuoleen



Lääkitys
ruuansulatuskanavaan
eli enteraalisesti

Nieltävä lääke

- Yleisimmin p.o. eli suun kautta nieltävä lääke
- Tabletti yleisin
 - Jakourteellisen saa puolittaa
- Voi olla myös kapseli
 - Kuoressa oleva lääke, kaksiosaisen saa avata
- Debot valmisteissa vaikutusaikaa pidennetty eli lääkeaine vapautuu hitaasti
 - ei saa pureskella, jauhaa tms. Puolittaa saa joskus (kurkkaa pakkausseloste)
- Enterotabletti tai kapseli päällystetty, jotta se on suojassa happamalta mahalta ja lääkeaine vapautuu vasta ohut- tai paksusuolella
 - Ei saa murskata eikä jauhaa. Puolittaa saa joskus (kurkkaa pakkausseloste)
- Geeli
- Purutabletti, poretabletti, annosjauhe, oraaliliuos, tipat

Lääkitys suunonteloon




- Eli intraoraalisesti
- Imeskelytabletti vaikuttaa paikallisesti
- Bukkaalitabletti laitetaan posken limakalvolle
- Resoribletti eli liukotabletti liukenee suussa, sublinguaalinen (s.l.) on kielen alle laitettava lääke
- Suuvoide, suuvesi, kurlausvesi
- Lääkepurkka

- Eli rektaalisesti (per rectum)
- Peräpuikot eli suppositoriot
 - Annettaessa potilas kylkiasentoon ja polvet koukkuun, käsiteet omiin käsiin, liukasta peräpuikko, työnnä peräsuoleen eteen ja ylöspäin etusormella niin syvälle kun saat
- Peräruiske eli rektioli ja pienoisperäruiske eli klysma
 - Antaminen melko samoin kuin peräpuikossa. Kun otat ruisketta pois peräsuolesta, pidä koko ajan puristettuna ja päästä irti vasta, kun pois peräsuolesta
- MUISTA KERTOAA MITÄ TEET kun annat ko lääkkeitä! Muuten voi olla vähän kurja kokemus.



Lääkitys peräsuoleen



● Lääkitys ruokintaletkuun

- Ruokintaletkun kautta voidaan antaa enteraalisesti käytettäviä nestemäisiä tai lietettyjä lääkeaineita.
- Harkittava voidaanko antaa injektiona, rektiolina tai lääkelaastarina