



SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSIEN KERTAUS

Riina Lindström


KOHONNUT VERENPAIN E

FINRISKI-laskuri

FINRISKI-laskurilla voi laskea riskin sairastua sydäninfarktiin tai vakavaan aivoverenkiertohäiriöön seuraavan kymmenen vuoden aikana. Laskuri kertoo sairastumisriskin prosentteina.

PÄHKINÄNKUORESSA
VERENPAIN E

Vastaanottopainetasoon¹ perustuva hoitokaavio



¹ Kohonnut painetaso on varmistettu verenpaineen kotimittausten tai pitkäaikaisrekisteröinnin avulla²


² Kotipaine tai ambulatorinen päiväpaine $\geq 135/85$ mmHg

RR-YHDISTELMÄLÄÄKEHOIDON VALINTA

ACE-estäjät: -priili
ATR-salpaajat: -sartaani

Loop-diureetti:
furosemiini
Tiatsidi-diureetti:
indapamidi,
hydroklooritiatsidi

(furosemiini tiatsididiureetteja
voimakkaammin vaikuttava)



Dihydropyridiinit: -dipiini
Verapamiili (Verpamil)
Diltiatseemi (Cardizem)

© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Esim. betaksololi,
bisoprololi, pindololi ja
propranololi

SEPELVALTIMOTAUTI

- Beetasalpaajat: esim. Bisoprololi (Emcncor)
- Kalsiumkanavan salpaajat: esim. Amlodipiini (Amlodipin)
- Veren hyytymistä estävät lääkkeet eli antitrombootit: varfariini (Marevan), dibigatraani (Pradaxa), rivaroksabaani (Xarelto) ja asetyylisalisyyhappo (Aspirin, Primaspan, Disperin)
- Nitraatit: eli nitrot
- Kolesterolilääkkeet: usein statiineja, kuten atorvastatiini, rosuvastatiini, simvastatiini

SYDÄMEN VAJAATOIMINTA

ACE-estäjät

ATR-salpaaja

Beetasalpaaja

Diureetti

Digoksiini (Digoxin) voi johtaa
myrkytykseen

FLIMMERI

- Beetasalpaajat sykkeen hallintaan
- Varfariinia tai suoria antikoagulantteja verisuonitukoksia estämään

