



Tehtävä

- 79-vuotia mies oli käyttänyt pari kuukautta donepetsiilia dementian hoitoon 5 mg vuorokaudessa
- Hänellä ilmeni voimakasta hyperseksuaalisuutta
 - Voiko haitta olla seurausta lääkityksestä?
 - Miten haitta olisi voitu estää?

Donepetsiili - Aricept®, Donepezil®, Doneratio®, Dopezon®, Mikzil®, Yasnal®

- Seksuaalisia käytösoireita on noin 10 %:lla alzheimerin tautia sairastavista
- Ne vaihtelevat rivosta kielenkäytöstä julkiseen masturbointiin tai fyysiseen seksuaaliseen ahdisteluun. Seksuaaliset käytösoireet ovat miehillä yleisempiä kuin naisilla. Omaiset ja hoitohenkilökunta kokevat hyperseksuaalisuuden kiusallisena oireena. Seksuaalisten käytösoireiden syynä ajatellaan olevan perinteisten käyttäytymismallien murentuminen, mutta myös frontaalisten aivoalueiden rappeutumisella on todettu olevan merkitystä. On hyvä muistaa, että dementoituneen toiminta ei välttämättä ole seksuaalista, vaan syynä voivat olla esimerkiksi epämukavat vaatteet tai potilaan virheellinen tunnistus omasta puolisoista.
- Hoito aloitetaan 5 mg:n vuorokausiannoksella (kerran vuorokaudessa). Hoitoa 5 mg:n vuorokausiannoksella on jatkettava vähintään yhden kuukauden ajan, ennen kuin kliininen hoitovaste on arvioitavissa ja donepetsiilihydrokloridipitoisuuden vakaa tila on saavutettu. Kun hoitoa on jatkettu yhden kuukauden ajan 5 mg:n vuorokausiannoksella, donepezil orion -annoksen voi kliinisen arvioinnin perusteella suurentaa 10 mg:aan kerran vuorokaudessa. Suositeltu enimmäisvuorokausiannos on 10 mg.