

Matti on otettu osastolle virtsatieinfektion ja yleistilan laskun vuoksi. Hänellä on myös kuumetta 37,8.

Matti on sekava, eikä muista missä on. Hän tarvitsee apua peseytymisessä ja ruokailussa.

Aamupalalla Matille tuodaan lautasellinen noin 2,5dl puuroa ja mukillinen mehukeittoa, sekä ravintolisä juoma 200ml. Matilla on hyvä ruokahalua ja hän syö kaiken aamupalalla. Matilla on potilaspöydällä vesikannu jossa on 1500 ml vettä. Mattia on ohjattu juomaan vettä päivän aikana.

Lounaalla Matti on erittäin sekava eikä suostunut syömään. Vesikannun huitaisi kädellään lattialle. Tähän mennessä Matti oli ehtinyt juomaan 400 ml vettä. Virtsa on erittynyt klo 12 mennessä 400 ml.

Osaston lääkäri määräyksen mukaan Matille aloitettiin nesteytys NaCl 1000ml + Ringer 1000ml/vrk.

Sekavuuden vuoksi Matti ei suostu ottamaan antibioottia suun kautta. Matille aloitettiin iv antibiootit Zinacef 1,5g iv x3. Osastolla antibiootti laimennetaan 100ml NaCl. Ensimmäisen annoksen hän saa klo 14 ja seuraavan annoksen hän saa klo 22. Klo 14 mennessä virtsa on erittynyt klo 300 ml.

Klo 16 Matti saa kipulääkkeenä Panadol 1g supon.

Päivällisellä Matti ruokailee avustettuna. Hän syö keittoa 300 ml ja kiisseliä 100ml. Ruuan kanssa hän juo nokkamukillisen maitoa.

Iltapalalla Matti on erittäin väsynyt. Hän ei jaksa syödä. Klo 20 mennessä virtsa on erittynyt 400 ml.

Aamuun mennessä NaCl 1000ml on mennyt kokonaan ja Ringer 1000ml infuusiosta on jäljellä 800ml.

Laske nestetasapaino nestelistaa apuna käyttäen.

Miten Matin nesteytys on onnistunut päivän aikana?

