

# Äkillisen kystiitin (virtсарakon ja virtsaputken infektio) toteaminen (puhelin)haastattelun perusteella 18–65-vuotiaalla naisella

Potilaan nimi \_\_\_\_\_ Syntymäaika \_\_\_\_\_

Haastattelijan nimi \_\_\_\_\_ Pvm, klo \_\_\_\_\_

## 1. Onko naisella yksi tai useampia seuraavista virtsatieinfektion oireista (tyypilliset oireet)

|                                 | Kyllä                    | Ei                       |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - tihentynyt virtsaamistarve    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - kirvely virtsatessa (dysuria) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - virtsaamispakko               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - verta virtsassa               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Oireisiin liittyviä kommentteja \_\_\_\_\_

## 2. Onko naisella vaikeahoitoisen virtsatieinfektion riskitekijöitä

|                                                                                                       | Kyllä                    | Ei                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - munuaisten monirakkulatauti tai munuaiskivitauti                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - rakon tyhjenemishäiriö (neurogeeninen rakko)                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - munuaisten vajaatoiminta                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - heikentynyt vastustuskyky (vaikean perussairauden tai vastustuskykyä heikentävän lääkityksen takia) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - virtsatiekatetri                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - raskaus                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - diabetes, jossa elinvaurioita                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - äskettäinen virtsateiden toimenpide                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Muita aikaisempiin sairauksiin liittyviä kommentteja \_\_\_\_\_

### 3. Onko naisella seuraavia hälyttäviä oireita tai esitietoja

Kyllä

Ei

- selkäkipu, kuume, vilunväristys, oksentelu,  
ripuli, kuivuminen, emätinvuoto,  
uusi seksipartneri, emätinkipu tai -kirvely  
tai yli 7 vrk kestäneitä oireita

☐☐

Oireisiin tai esitietoihin liittyviä kommentteja \_\_\_\_\_

### 4. Lisätietoja (esim. lääkeaineallergiat)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Jos naisella on vähintään kaksi tyypillistä oiretta (kysymys 1) ilman erityisiä riskitekijöitä tai muita liitännäisoireita, hoito voidaan toteuttaa suosituksen mukaisesti ilman laboratoriotutkimuksia. Muussa tapauksessa lisäselvitykset (laboratoriokokeet, kliininen tutkimus) voivat olla tarpeen.**

Kirjaa haastattelun tulos

### Muistuta ja ohjeista

- Muistuta potilasta, että oireiden häviäminen voi kestää yli 3 vrk lääkityksen aloittamisesta.
- Ohjeista potilas ottamaan yhteyttä, jos oireet eivät helpota 4 vrk:ssa tai oireet uusiutuvat.
- Anna potilaalle mahdollisuus käydä vastaanotolla, jos hän sitä haluaa.

\*\*\*\*\*

Lisätietoja, ks. Käypä hoito -suositus Virtsatieinfektiot, kohta Diagnostiikka aikuisilla, Oireet ja tasodiagnostiikka; päivitys 7.9.2011, [www.kaypahoito.fi](http://www.kaypahoito.fi)  
Lomake perustuu julkaisuun Schauburger CW, Merkitch KW, Prell AM. Acute cystitis in women: experience with a telephone-based algorithm. WMJ 2007;106:326-9



Käypä hoito