

PSYYKENLÄÄKKEIDEN KÄYTÖN
EDELLYTTÄMÄ
LABORATORIOSEURANTA

PSYKOOSILÄÄKKEET

- KOL, TRIGLY, GLUK, EKG ensipsykoosipotilaalla
- KOL, TRIGLY, GLUK, EKG 3 ja 12 kuukauden kuluttua uuden hoidon aloittamisesta ja sen jälkeen vuosittain
- KLOTSAPIININ KÄYTTÖ EDELLYTTÄÄ EDELLISEN LISÄKSI EHDOTTOMAN PAKOLLISTA VERENKUVASEURANTAA.
- KLOTSAPIININ VERENKUVASEURANTA NORMAALITILANTEESSA
- LEUKOSYYTTILASKENTA JA ERITTELY ALLE 10 VUOROKAUTTA ENNEN HOIDON ALOITTAMISTA
- LEUKOSYYTTILASKENTA JA ERITTELY VIIKOITTAIN 18 HOITOVIIKON AJAN
- LEUKOSYYTTILASKENTA JA ERITTELY EDELLISEN JÄLKEEN VÄHINTÄÄN 4 VIIKON VÄLEIN JA 4 VIIKKOA HOIDON LOPETUKSEN JÄLKEEN
- VERENKUVAMUUTOSTEN ILMETESSÄ NOUDATA TARKASTI VALMISTEYHTEENVEDON OHJEITA
- JOS KLOTSAPIINIHOITO ON LOPETETTU JA JOKO 1) LEUKOSYYTTIEN MÄÄRÄ LASKEE ALLE $2,0 \times 10^9/L$ TAI 2) ABSOLUUTTINEN NEUTROFIILIEN MÄÄRÄ ALLE $1,0 \times 10^9/L$, TULEE KOKENEEN HEMATOLOGIN OHJATA HOITOA

MASENNUSLÄÄKKEET

MASENNUSLÄÄKKEISTÄ VAIN AGOMELATIINIHOITO EDELLYTTÄÄ RUTIININOMAISTA LABORATORIOKOESEURANTAA.

AGOMELATIINI JA MAKSAKOESEURANTA NORMAALITILANTEESSA

- ALAT, ASAT ENNEN HOITOA

- ALAT, ASAT 3, 6, 12 JA 24 VIIKON KULUTTUA HOIDON ALOITUKSESTA JA AINA ANNOSTA SUURENNETTAESSA

- MAKSA-ARVOJEN NOUSTESSA NOUDATA TARKASTI VALMISTEYHTEENVEDON OHJEITA.

KAKSISUUNTAISEN MIELIALAHÄIRIÖN LÄÄKKEET

- LITIUMIN LABORATORIOKOESEURANTA NORMAALITILANTEESSA
- PVK, TSH, KREA (EGFR), NA, K, CA, EKG ENNEN HOIDON ALOITUSTA
- TSH, KREA (EGFR), NA, K ENSIMMÄISEN HOITOVUODEN AIKANA 4 KUUKAUDEN VÄLEIN
- TSH, KREA (EGFR), NA, K, CA, EKG JATKOSSA KERRAN VUODESSA
- S-LITIUM VIIKON KULUTTUA ALOITUKSESTA JA AINA ANNOSNOSTOJEN JÄLKEEN, LISÄKSI AINA VUOSITTAIN

- **VALPROAATIN LABORATORIOKOESEURANTA NORMAALITILANTEESSA**
 - **PVK, ALAT, AFOS, KREA (EGFR) ENNEN HOIDON ALOITUSTA**
 - **PVK, ALAT, AFOS, KREA (EGFR) HOIDON AIKANA 6 KUUKAUDEN VÄLEIN**
-
- **KARBAMATSEPIININ LABORATORIOKOESEURANTA NORMAALITILANTEESSA**
 - **PVK, ALAT, AFOS, NA, K, KREA (EGFR) ENNEN HOIDON ALOITUSTA**
 - **PVK, ALAT, AFOS, NA, K, KREA (EGFR) HOIDON AIKANA 6 KUUKAUDEN VÄLEIN**

- **AHDISTUNEISUUDEN HOITOON KÄYTETTÄVÄT LÄÄKKEET (ANKSIOLYYTIT)**
- **RUTIINILABORATORIOKOKOKEITA EI TARVITA.**
- **HYPNOOTIT JA SEDATIIVIT**
- **RUTIINILABORATORIOKOKOKEITA EI TARVITA.**
- **TUPAKOINNIN LOPETTAMISEN TUkena KÄYTETTÄVÄT LÄÄKKEET**
- **VARENIKLINI-, BUPROPIONI- TAI NIKOTIINIHOITOON LIITTYVIÄ RUTIINILABORATORIOKOKOKEITA EI TARVITA.**

- ALKOHOLI- JA HUUMEVIEROITUSLÄÄKKEET
- NALTREKSONI- TAI NALMEFEENIHOIDOSSA EI TARVITA RUTIINILABORATORIOKOKKEITA, MUTTA DISULFIRAAMIHOITOON KUULUU MAKSAN TOIMINTAKOKEIDEN SEURANTA.
- KLIINISEEN, YKSILÖLLISEEN HARKINTAAN JÄÄ, MISSÄ MÄÄRIN ALKOHOLI TAI MUUT PÄIHTEET TAI SAIRAUDET OVAT JO VAIKUTTANEET TAI VAIKUTTAVAT MAKSAN TOIMINTAAN DISULFIRAAMIHOIDON AIKANA.
- DISULFIRAAMIHOIDON LABORATORIOKOKKEET
- ALAT, ASAT, GGT, BIL ENNEN HOIDON ALOITUSTA
- ALAT, ASAT, GGT, BIL 2 VIIKKOA HOIDON ALOITUKSESTA
- ALAT, ASAT, GGT, BIL 2 KUUKAUTTA HOIDON ALOITUKSESTA
- ALAT, ASAT, GGT, BIL 3–6 KUUKAUDEN VÄLEIN HOIDON ALOITUKSESTA