

Laskimonäytteen ottamiseen liittyviä komplikaatioita

(Mukaillen: Anttila ym. Sairaanhoido ja huolenpito. 2015. Sanomapro)

Komplikaatio	Syyt ja oireet	Miten toimit?
<i>Pyörtyminen</i>	Potilas voi jännittää, jonka seurauksena RR laskee ja lopulta tajunta häviää	- pyri laukaisemaan jännitys - ohjaa huonovointinen potilas makuulle ja jalat ylös - kun tajunta palaa, tarjoa juomista - varmista, että potilas on hyväkuntoinen, ennen kuin hän palaa kotiin
<i>Hyperventilaatio</i>	Hengitys syvenee ja tihenee. Raajoissa ja suun ympärillä voi tuntua pistelyä	- rauhoittele potilasta ja ohjaa häntä rauhalliseen hengittämiseen
<i>Mustelma eli hematooma</i>	Mustelma syntyy, kun neula lävistää laskimon takaseinän mustelma näkyy ensin pullistumana	- keskeytä näytteenotto laskimon takaseinän rikkoutuessa ja paina pistokohtaa taitoksella n.5 min - sairaus tai lääkitys voi lisätä verenvuotoa (esim. marevan)
<i>Valtimosuonen seinämän puhkeaminen</i>	Erota valtimo ja laskimo: Valtimossa tuntuu syke, ja sen seinämä on kimmoisa. Valtimon veri on helakan punaista ja se tulee suonesta paineella.	- Tunnustele pistosalue ennen näytteenottoa - jos valtimosuonen seinämä puhkeaa, keskeytä näytteen otto ja paina pistoskohtaa taitoksella 15 min - kättä ei saa rasittaa vuorokauteen
<i>Laskimotulehdus eli flebiitti</i>	Pistoskohdan iho on punakka, lämmin ja arka, ja laskimo tuntuu kovalta ja kipeältä. Laskimotulehduksesta kehittyy helposti laskimoa tukkiva tukos eli tromboflebiitti	- Aseta raaja lepoon, annan tarvittaessa kipulääkettä - ole huolellinen ihon desinfiointissa ja muussa aseptiikassa - vaihda laskimokanyylin paikkaa väh.3 vrk:n välein
<i>Hermopistos</i>	Potilas säpsähtää äkillisestä kivusta	- keskeytä näytteenotto - hermopistos on kipeä muutaman päivän, mutta paranee itsestään