

TAUTIKOHTAISET OHJEET

SAIRAUDEN AIKA = AIKA, JOLLOIN LAPSI SAIRAUTENSA VUOKSI EI OLE KYKENEVÄ OSALLISTUMAAN PÄIVÄHOIDON NORMAALIIN TOIMINTAAN.

ILMOITETUT POISSAOLOAJAT OVAT OHJEELLISIA VÄHIMMÄISAIKOJA. LAPSEN VOINTI RATKAISEE POISSAOLON PITUUDEN PÄIVÄHOIDOSTA

Tavallisimmat lasten infektioaudit ja suositukset päivähoitoa varten.

Tauti	Tartuttavia	Leviäminen	Itämisaika	Oireita	Suositus päivähoidosta poissaoloajaksi, mikäli lapsen yleiskunto sallii
Yskä, nuhakuume, keuhkoputken tulehdus	Nenän ja nielun eritteet	Pisara- ja kosketustartunta	1-3 vrk	Väsymys, nuha, yskä, kurkkukipu, kuume	Sairauden ajan
Korvatulehdus	Nenän ja nielun eritteet, korvavuoto	Pisara- ja kosketustartunta		Korvasärky, nuhakuume, yskä, korvavuoto	Sairauden ajan
Ripuli, oksentelu	Nenän ja nielun eritteet, ulosteet, oksennus	Pisara- ja kosketustartunta	1-3 vrk	Väsymys, ruokahaluttomuus, oksentelu, vatsavaivat ja ripuli. Usein myös kuume.	Sairauden ajan * Kunnes lapsi on ollut 48 tunnin ajan oireeton
Märkäinen silmätulehdus	Silmäräjä, nenän ja nielun eritteet.	Pisara- ja kosketustartunta	1-3 vrk	Silmien punoitus ja rähmiminen.	Sairauden ajan
Märkärupi	Märkäerite	Kosketustartunta	1-3 vrk	Iholla olevat näppylät, jotka muuttuvat nopeasti märkäisiksi ja rupiseiksi.	Rupien kuivumiseen asti. (24 h tabl.hoito, 48 h paikallishoito)
Tulirokko ja angiina	Nenän ja nielun eritteet	Pisara- ja kosketustartunta	1-5 vrk	Kuume, pahoinvointi, oksentelu, kasvojen punoitus, kurkkukipu, rauhasturvotus leukakulmissa, mannarynimäinen punoittava ihottuma vartalolla.	Sairauden ajan. Vähintään 24 h antibiootihoidon aloittamisen jälkeen.
Vesirokko	Nenän ja nielun eritteet, rakkulaerite	Pisara- ja kosketustartunta	2 viikkoa	Kuume, vartalolta alkava rakkulamainen ihottuma, mikä muuttuu rupiseksi, kutina	Kunnes ruvet ovat kuivuneet eli vähintään 5 vrk rakkuloiden puhkeamisesta.

*SHIGELLA, SALMONELLA JA EHEC. KONSULTOI TARTUNTATAUTIEN VALVONTAA P.02- 266 1143

Tauti	Tartuttavia	Leviäminen	Itämisaika	Oireita	Suositus päivähoidosta poissaoloajaksi, mikäli lapsen yleiskunto sallii
Parvorokko	Nenän ja nielun eritteet	Pisara- ja kosketustartunta	4-14 vrk	Lämpöily, poskien punoitus, raajoilla ja vartalolla esiintyvä ihottuma, nivelpaikat. Odottavilla äideillä infektio saattaa johtaa keskenmenoon	Sairauden ajan Ei tartu enää ihottumavaiheessa.
Enterorokko	Nielun eritteet, ulosteet	Pisara- ja kosketustartunta	3-6 vrk	Kuume, vaihteleva ihottuma, rakkulat kämmenissä tai jalkapohjissa.	Sairauden ajan
Kihomato	Kihomadon munat	Kosketustartunta	2-3 viikkoa	Peräaukon kutina, erityisesti iltaisin	Hoidon keston ajan
Täit	Saivareet	Kosketustartunta	1-2 vrk	Jatkuva kutina, saivareet, joskus oireeton. Tällöin eri kehitysmuotoja löytyy yleensä korvien takana ja niskakuopassa.	Hoidon ajan
Syyhy		Kosketustartunta	n. 1 kk	Kutiava ihottuma, ihon bakteeri-infektio, käytävä/rakkulaihottuma sormien välissä, taiteiden sisäpuolella, alavatsalla	Shampoo pesut. 24 h hoidon loppumisesta
Ontelosyylä		Kosketustartunta		2-6 mm:n läpimittaiset syylät iholla, infektoituvat usein. Puristeltaessa saadaan esiin taikinamaista massaa.	Eristys ei ole tarpeellinen. Ei yhteisiä uima- tai alusvaatteita.
Hinkuyskä	Nenän ja nielun eritteet	Pisara- ja kosketustartunta	1-3 viikkoa	Yskä, puuskittainen yskä, hinkuminen, oksentelu	5vrk makrolihoidon alkamisesta tai yli 21 vrk oireiden alkamisesta
Hepatiitti A	Ulosta	Kosketustartunta	4vko:a	Vatsavaivat, ruokahaluttomuus, kuume, ihon keltaisuus. Suuri osa oireettomia.	1vko keltaisuuden alusta, 2vko ensioireiden alusta

JOS LAPSEN EPÄILLÄÄN SAIRASTUNEEN TUHKAROKKON, VIHURIROKKON TAI SIKOTAUTIIN, ON ASIA VARMISTETTAVA VERIKOKEELLA. POISSAOLO ERILLISTEN OHJEIDEN MUKAAN.

*VAIKEISSA RIPULITAPAUKSISSA ON SYYTÄ HARKITA MYÖS TERVEIDEN SISARUSTEN POISSAOLOA PÄIVÄHOIDOSTA, JOTTA EPIDEMIA EI LEVIÄISI PÄIVÄHOIDOSSA.