

KOULUSTA ON LÖYTYNYT TÄITÄ.

Toivon, että luette tiedotteen ja tarkistatte kotona lapsenne pään. Seurantaa kannattaa jatkaa noin kahden viikon ajan. Näin saadaan täitartunnan saaneille samanaikainen hoito. Tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan.

JOS SAAT PÄÄTÄIN

Olet saanut päätäin todennäköisesti toisesta henkilöstä, harjasta, kammasta tai päähineestä. Täi ei hypi eikä lennä, vaan tarttuu lähikontaktissa. Se ei poistu itsestään, vaan lisääntyy hoitamattomana. Päätäi elää vain ihmisessä ja se saa ravintonsa imemällä verta hiuspohjasta. **Hiuspohjan ulkopuolella päätäi elää vain noin 55 tuntia.**

NÄIN TUNNISTAT PÄÄTÄIN

- Päätäit ovat silmin nähtävissä
- Päätäit ovat liikkuvia, täysi-ikäisinä 1-4 mm pitkiä ja niiden väri voi vaihdella läpikuultavasta tummaan.
- Päätäit löytävät tiensä useimmiten korvien taakse ja niskakuoppaan.
- Päätäi munii 5-8 vaaleaa saivareta päivässä. Saivareet, pienet helmenharmaat munat, ovat tiukasti kiinni hiuksissa. Juuri munitut sijaitsevat aivan hiusten juurissa ja näistä kehittyvät uusia yksilöitä. Myös ne voi havaita paljaalla silmällä hyvässä valaistuksessa.
- Saivareesta kuoriutuu nymfi 5-9 vuorokauden kuluttua. Aikuisuuden ne saavuttavat 2 viikon kuluessa.
- Aikuinen naaras munii n. 4 viikon elinaikana 50-150 munaa eli saivareta.
- Toisille tulee jatkuva kutina hiuspohjaan, etenkin korvien taakse ja niskakuoppaan. Tämä johtuu siitä että, imiessään verta hiuspohjasta täit sylkevät veren hyytymistä estävää entsyymiä haavaan.

NÄIN POISTAT PÄÄTÄIN

Hiukset tarkastetaan tekemällä tukkaan jakauksia 1 cm:n välein. **Hiukset tutkitaan juuresta latvaan** ja katsotaan, onko niissä täitä tai onko niihin kiinnittynyt saivareita.

Apteekista on saatavissa reseptivapaasti täishampoota (esim. Prioderm, Nix) täiden poistamiseksi. Kaikki perheenjäsenet hoidetaan. Hoito-ohjeita tulee noudattaa. On tärkeää tehdä tarkastus ja hoito kaikille perheenjäsenille samanaikaisesti. Seurantaa jatketaan kotona noin 4 viikon ajan. Tiheällä täikammalla kampausta noin 2 vko 2-3- päivän välein. Uusien elävien täiden tai saivareiden löytyminen n. 5 mm etäisyydeltä päänahasta on merkki hoidon epäonnistumisesta.

Hiusten käsittelyn jälkeen patjat, peitot ja tyynyt imuroidaan. Lisäksi pestään kaikki sellaiset vaatteet ja tavarat, joissa saattaa olla täitä tai saivareita (vuodevaatteet ja pyyhkeet normaalissa pyykissä 60 asteessa, päähineet, kammat, harjat). Osan tavaroista voi viedä esim. kolmeksi päiväksi varastoon tai parvekkeelle. Täi kuolee myös vuorokaudessa -20 asteen pakkasessa ja 2 tunnissa n. +80 asteen lämmössä. Esim. Päähineet ja pehmolelut voi laittaa muovipussissa pakastimeen.

(Lähde : Kansanterveyslaitos, Kansanterveys, 1/2007)

LASTEN VANHEMMILLE

- Jos koulusta ilmoitetaan täitartunnasta, on ilmoitus otettava vakavasti. Koko perhe on tarkastettava ja tarvittaessa hoidettava. On myös tärkeää tiedottaa tartunnan mahdollisuudesta läheisissä kanssakäymisissä oleville henkilöille.
- Päätäitä voi esiintyä kenellä tahansa. Niiden esiintyminen ei merkitse sitä, että lapsenne olisivat muita likaisempia.
- Lasten hiukset on hyvä tarkistaa silloin tällöin, etenkin jos he ovat olleet leirillä muiden lasten tai nuorten kanssa.
- Päätäit lisääntyvät nopeasti. Ne täytyy välittömästi hoitaa pois.
- Kun havaitsette päätäin ottakaa yhteys kouluterveydenhoitajaan tai lastenneuvolan terveydenhoitajaan