koska peräkkäiset kokonaisluvut
→ jompi kumpi on parillinen
→ $k(k+1) = 2t$, $t \in \mathbb{Z}$

$= 4 \cdot 2t = 8t$, $t \in \mathbb{Z}$
⇒ on jaollinen luvulla 8 ⇒ väite m.o.t.

「TAI: $n^2 - 1 = (n-1)(n+1)$

n parittoman → 2 peräkkäistä parillista lukua
→ jompi kumpi niistä on jaollinen 4:llä

$= 2 \cdot 4 \underbrace{t}_{\in \mathbb{Z}} = 8t$ ⇒ väite 」

jakoyhtälö: $a = qb + r$, $0 \le r < b$
⇒ jokainen luku $a \in \mathbb{Z}$ on jotakin seuraavista muodoista:
$qb, qb+1, qb+2, \ldots, qb+(b-1)$ ($b \neq q$)

Esim. $b = 2$ ⇒ muodot: $2k$ (parillinen) tai $2k+1$ (pariton)
$b = 3$ ⇒ muodot: $3k$, $3k+1$ tai $3k+2$
$(0, \pm 3, \pm 6, \pm 9, \ldots)$ $(1, 4, 7, \ldots$ $-2, -5, \ldots)$ $(2, 5, 8, \ldots$ $-1, -4, \ldots)$

Esim. Onko $n^3 - n$ aina jaollinen luvulla 3 kun $n \in \mathbb{Z}$?

Ratk.
$0^3 - 0 = 0 = 0 \cdot 3$ ✓
$1^3 - 1 = 0 = 0 \cdot 3$ ✓
$2^3 - 2 = 6 = 2 \cdot 3$ ✓
$3^3 - 3 = 24 = 8 \cdot 3$ ✓
⋮
} Väite voidaan todeta

n on jotakin seuraavista muodoista:
1° $n = 3k$: $n^3 - n = (3k)^3 - 3k = 27k^3 - 3k = 3\underbrace{(9k^3 - k)}_{\in \mathbb{Z}}$ ✓
on jaollinen 3:lla

2° $n = 3k+1$: $n^3 - n = (3k+1)^3 - (3k+1) = (3k+1)(3k+1)^2 - (3k+1)$
$= (3k+1)(9k^2 + 6k + 1) - (3k+1)$
$= 27k^3 + 18k^2 + 3k + 9k^2 + 6k + 1 - 3k - 1$
$= 27k^3 + 27k^2 + 6k = 3\underbrace{(9k^3 + 9k^2 + 2k)}_{\in \mathbb{Z}}$ ✓
on jaollinen 3:lla