

Handwritten text: *Handwritten text*

Puut

Ruokakasvit

S.4-9

S.50-57

Sienet

Sammaleet ja
jäkälät

S.10-21

S.58-69

Kukkivat

Extra


S.22-39

S.70-75

Heinät

S.40-49

Kaikki kuvat on
otettu
Jokioisilla
22.8.2017



Leppä

Tuntomerkit:

Lepät ovat koivukasvienheimoon kuuluva alalaji, johon kuuluu yli kolmekymmentä eri puu- ja pensaslajia. Lepällä on pyöreähköt lehdet ja harmahtava runko. Terva- ja harmaalepät ovat yleisimpiä Suomessa. Leppä voi kasvaa jopa 3-20 metriseksi.

Esiintyminen:

Leppää esiintyy lähes koko suomessa. Harmaaleppää esiintyy kaikkialla lukuunottamatta eteläisiä rannikkoseutuja ja pohjoisinta Lappia.




Koivu

Tuntomerkit:

Koivun tuohi on väriltään valkoinen, mutta sen päällä on tummempaa ainesta. Lehdet ovat riippuen koivurodusta, joko sahalaitaisia tai hieman pyöreämpiä.

Esiintyminen:

Rauduskoivu menestyy parhaiten keski- ja runsasravinteisilla kasvupaikoilla. Toisin kuin hieskoivu, joka pärjää myös märillä turvemaidella, rauduskoivu ei selviä vähähappisessa ympäristössä. Tämä rauduskoivu on löydetty Vaulammilta syyskuussa.



Mänty

Tuntomerkit:

Mänty luokitellaan havupuuksi, sillä se omaa neulaset. Männyn runko on ruskea.

Esiintyminen:

Mänty viihtyy parhaiten kuivilla alueilla. Tämä mänty on löydetty Vaulammilta.

Kuusi

Tuntomerkit:

Kuusella on havut ja se erittää pihkaa rungostaan. Runko on ruskea.

Esiintyminen:

Kuusia esiintyy enimmäkseen pohjoisella pallonpuoliskolla, kuivassa ja viileässä.

Tämä kuusi on löytynyt Jokioisilta.


Salava

Tuntomerkit:

Salava on lehtipuu. Se kasvaa yleensä suht suureksi. Salavalla on suipot lehdet ja yleensä haarautuva runko. Pensasmainen.

Esiintyminen:

Salava kasvaa luonnonvaraisena Euroopassa ja Aasiassa, Suomessa todennäköisesti tuonti tuote. Löysin salavan omalta pihaltani.



Esiintyminen:

Punakärpässien
yleensä metsissä
teittenreunoilla.
Itse löysin siene
puraradalta.

Punakärpässieni

Tuntomerkit:

Punainen lakki, jossa on valkoisia läikkiä ja hohtavanvalkoinen jalka, jonka ylä-osa näyttää hieman valuilta steariinilta.



ntä esiintyy
sä, tai

.
en Jokioisten

Myrkyllisyys:

Jos punakärpässientä joutuu suuhun, suositellaan siirtymistä välittömästi sairaalan tiloihin.



Esiintyminen:

Herkkutattia tavataan lähes kaikissa seka- ja havumetsissä.

Löysin tämän Vaulammilta syyskuun lopulla.

Herkkutatti

Tuntomerkit:

Herkkutatin tunnistaa pilleistä ja kullanruskeasta väristä.
Tatti on pullea ja hieman tahmea.

Myrkyllisyys:

Ei ole myrkyllinen vaan
erittäin arvostettu
ruokasieni.



Männunherkkutatti

Tuntomerkit:

Punaruskea väri paljastaa
tatin kuivien
mäntykankaitten seasta.
Pillit.

Esiintyminen:

Männynherkkutattia esiintyy
yleensä männyköissä tai
niiden alla. Itse löysin sen
okioisten pururadalta
syyskuussa.

Myrkyllisyys:

Tatti ei ole myrkyllinen
vaan Suomessa esiintyvä
kauppasieni.



Myrkyllisyys:

Esiintyminen:

Tuntomerkki:





Tuntomerkit:

Esiintyminen:



Esiintyminen:
Korvasientä esiintyy
koko maassa.


Myrkyllisyys:
Eriyisen myrkylline
ELÄ KOSKE!!!!

Korvasieni

Tuntomerkit:

Punertavan-, suklaan-, tai mustanruskea lakki, joka on epäsäännöllisen muotoinen ja muistuttaa hieman aivoja tai tippaleipää. Lakki on parhaimmillaan noin. 15cm kokoinen

Vuokkiva



Voikukka

Tuntomerkit:


Voikukka on keltainen ja varresta tulee maitomaista eritettä.

Kukittuaan se muuttuu vaaleaksi höytyväpalloksi.

Esiintyminen:

Voikukkaa esiintyy eniten alku kesästä, mutta sitä tavata vielä alku syksystäkin.

Löysin tämän voikukan





Maitohorsma

Tuntomerkit:

Maitohorsman tunnistaa suurista kukista, jotka levittyvät terttuina kasvin yläosaan. Maitohorsmat kasvavat noin. 50-150cm korkeiksi. Siementen kypsyessä niistä muodostuu valkoisia haituvapalloja.

Esiintyminen:

Maitohorsmaa esiintyy yleensä hiekkaisilla ja kivisillä paikoilla, metsien hakkuualueilla ja tienpientareilla.




Purtojuuri

Tuntomerkit:

Purtojuurella on täysin
pyöreät kukat ja pienet
kukat muodostavat
yhdessä suuremman.

Esiintyminen:

Kasvia esiintyy kosteilla
niityillä, enimmäkseen
Etelä-Suomessa.



Peltosaunio

Tuntomerkit:

Peltosauniolla, eli saunakukalla on
tillimäinen varsi,
päivänkakkaramaiset, ohuet,
valkoiset lehdet ja kellertävä,
epätasainen keskusta.

Esiintyminen:

Pientareilla ja pihoilla, koko
suomessa esiintyvä kasvi.



Esiintyminen:
Peltovalvattia voi
löytää pelloilta,
joutomailta,
puutarhoista, rannoita,
niityiltä ja tien varsilta.

Peltovalvatti

Tuntomerkit:

Peltovalvatin korkeus vaihtelee 40-150 cm välillä. Ontot, lehdekkäät ja runsaasti maitiaisnestettä sisältävät varret nousevat laajan, vaakasuoran juuriston silmuista. Mykeröt ovat pitkäperäisiä ja 4-5 cm leveitä, keskusta on väriltään keltainen. Laji kukkii Suomessa heinä-elokuussa.



Valkoapila

Tuntomerkit:

Valkoapila on valkoinen apila, joka kestää hyvin tallaamista. Apilalla on vihreät, kolmesakaraiset lehdet, joissa on vaaleampi kuvio keskellä.

Esiintyminen:

Valkoapilaa esiintyy niityillä ja tien penkoissa, oikeastaan lähes kaikkialla.



Tuntomerkit:

Esiintyminen:

Kissankello

Tuntomerkit:

Kissankello on yleisimpiä kellokasvejamme. Ohut varsi on noin. 20-30cm pitkäksi. Pulleat kellot ovat varren latvassa. Väriltään ne ovat vaaleansinisiä.

Esiintyminen:

Kissankelloa löytää niityiltä, kallioilta, rinteiltä, yleinen lähes koko Suomessa.

Siankärsämö

Tuntomerkit:

Siänkärsämöllä on paljon pieniä valkoisia kukkia jotka kasvavat ryppäitä. Kukat voivat olla myös vaaleanpunaisia. Varsi on noin 20-40 cm pitkä.



Esiintyminen:

Kuivilla rinteillä asustavaa siankärsämöä voi löytää myös tienvarsilta.

Kenet

Three green wavy lines drawn below the word 'Kenet'.

Timotei

Tuntomerkit:

Timoteit saattaa kasvaa
yli 100cm korkeiksi.

Päässä on töyhtö, joka
koostuu pienistä
hahtuvista.

Esiintyminen:

Timoteita
löytää tien
penkoilta ja
niityiltä.





Lampaannata

Tuntomerkit:

Lampaannataa kasvaa
tuppaina. Varret ovat
kapeat, vähänkuin
jäykkää karvaa.

Esiintyminen:

Lampaannataa löytää
tien penkoilta ja
niityiltä, puutarhoista.



Esiintyminen:
Hopeaheinää esiintyy
metsissä ja pihhoilla.

Hopeaheinä

Tuntomerkit:

Hopeaheinä viiltää
helposti viiltoja. Se
kasvaa puskina ja se voi
kasvaa yli metriseksi.

Ruokonata

Tuntomerkit:

Esiintyminen:

Nurmirölli

Nurmirölli

Nurmirölli voi kasvaa hyvässä maassa noin 30 cm korkeaksi, kuivissa oloissa se jää matalammaksi. Nurmiröllin lehdet ovat kapeat. Hienorakenteinen röyhy on aluksi punertava, syksyä kohti se tuleentuu vaaleaksi.

Esiintyminen:

Nurmirölliä esiintyy tienvarsilla, pelloilla ja niityillä.

Marjia

Metsämansikka

Tuntomerkit:

Metsämansikalla on suuret lehdet ja punaiset marjat. Lehdet ovat usein kolmiosaisia ja vihertäviä.



Esiintyminen:

Mansikkaa esiintyy kuivilla ja aukeilla paikoilla.

Metsämansikka ei menesty tiheissä paikoissa.

Metsämustikka

Tuntomerkit:

Metsämustikka on noin. 10-15cm korkea ruokakasvi. Mustikkalla on varvut, joista se pudottaa suipot lehtensä talvisin. Mustikalla on sinertävät marjat, joissa on punertava sisälmys.

Esiintyminen:

Mustikkaa kasvaa tuoreissa kangasmetsissä ja korvissa.

Metsämustikka viihtyy kosteassa ja viileässä.



Metsävadelma

Tuntomerkit:

Vadelmapensas voi kasvaa noin kaksimetriseksi. Vadelman varsi on piikikäs ja sille on vihreät, sahalaitaiset lehdet. Marjat ovat kypsinä tumman punaisia.

Esiintyminen:

Vadelmaa esiintyy hakkuualueilla, ojien vierustoilla ja kallioilla. Vadelmaa esiintyy koko Suomessa lukuun ottamatta pohjoisinta Lappia.



Puolukka

Tuntomerkit:

Puolukka on punamarjainen ruokakasvi, jolla on paksut, mattapintaiset, karvaiset, suipot lehdet. Varvut ovat noin 5-30cm korkeita.

Esiintyminen:

Puolukkaa esiintyy lähes koko Suomen metsissä. Se kestää myös auringon paahdetta. Kuivat olot ovat puolukalle parhaat.

Lakka

Tuntomerkit:

Lakan marja on keltainen, ja runko voi kasvaa jopa 25cm korkeaksi. Kukat ovat valkoisia, halkaisijaltaan noin. 1-3 cm.


Esiintyminen:

Lakkaa asuu suolla.

Sammallet

ja
" " " " " "

jakalat



Rahkasammal

Tuntomerkit:

Pötkyläinen, hieman
röyhelöä muistuttava,
laatoissa kasvava
sammal.

Esiintyminen:

Rahkasammalten suku
asuu soilla ja kosteilla
tundra-alueilla. Pääosin
esiintyy Pohjoisella-
pallonpuoliskolla.



Sor



Esiintyminen:
Sormipaisuketta
esiintyy puiden oksissa
ja joskus kivissä.

Sormipaisukejäkälä

Tuntomerkit:

Sormipaisukejäkälä on

Suomen yleisin jäkälä.

Se on harmaa ja

muodoltaan

voimakkaasti

liuskoittunut ja kasvaa

löyhästi alustaansa

vasten.



Esiintyminen:
Sulkasammalta esiintyy
synkissä metsissä.

Sulkasammal

Tuntomerkit:

Sulkasammal kasvaa
noin. 2-4 cm korkeaksi.

Symmetrinen
lunnunsulan
muotoinen, melko
vaaleanvihreän
värinen.



Tuntomerkit:

Esiintyminen:




Tuntomerkit:

Esiintyminen:

Tuntomerkit:

Esiintyminen:



Tuntomerkit:

Esiintyminen:





Tuntomerkit:

Esiintyminen:



Tuntomerkit:

Esiintyminen:

Tuntomerkit:

Esiintyminen:

