


YRHO
Lääkehoito

Riina Lindström

Lääkehoito

- Hoitokeino, aloituksesta päättää lääkäri, sairaanhoitaja tai terkkari
- Lääkehoidon toteutusta erilaisissa ympäristöissä (kuten päiväkotia, koulu, ip-toiminta, koti)



Lääkehoitosuunnitelma



Yksinkertaisimmillaan potilas- tai asiakaskohtainen lääkehoitosuunnitelma on lääkemääräys eli resepti tai ajantasainen lääkityslista.



Tehty yhteisymmärryksessä asiakkaan (ja huoltajien) kanssa.



Henkilökohtainen suunnitelma tehdään, kun joku tarvitsee esim. koulupäivän aikana välitöntä lääkitystä (allergia, pitkäaikaissairaus tms.)

Mitä lääkehoitosuunnitelmaan kirjataan

- Sairaus/ oire
- Milloin tarve lääkeshoidolle
- Missä lääkkeet säilytetään
- Miten lääke annetaan
- Kuka antaa lääkkeen
- Mitä muita tmp lääkkeen antaminen edellyttää
- Kenellä tarvitsee olla tieto sairaudesta ja lääkeshoidosta

Lääkityksen tarve

Voi olla välitöntä hoitoa
vaativaa lääkitystä

Pitkäaikaissairauksien
lääkitystä

Satunnaista, oireita
lievittävää lääkitystä

Lääkkeiden antoreittejä

P.O., per oss, suun kautta

Pistettävät lääkkeet (tässä
tapauksessa adrenaliini,
glukagoni ja insuliini)

Inhaloitavat, hengitettävät
lääkkeet



Lääkkeen antaminen suun kautta

Esim.

- Tulehduskipulääkkeet (esim. Burana), kipulääkkeet (esim. Panadol)
- Antibiootit
- Jakoviivalliset saa puolittaa
- Tarkista jauhaminen
- Nestemäiset valmisteet

Lääke voidaan annostella myös suuhun.
Mikä lääke voisi olla tällainen?

Nitro-suihke/ kielenalustabletti 1/2

- Levähtäminen. Puoli-istuvaan asentoon, jos mahdollista
 - Annostele kaksi Dinit-suihketta kielen päälle
 - Kipu/oire helpottaa yleensä muutamassa minuutissa
 - Jos oire ei hellitä, annostele uudelleen kaksi Dinit-suihketta n. viiden minuutin kuluttua
 - Jos oire ei vieläkään hellitä tai uusiutuu, annostele vielä kaksi Dinit-suihketta
 - Jos oirekohtaus/ kipu ei mene ohi 15 minuutissa ⇒ **SOITA 112.**
-
- Dinit-suihkeen käyttö sepelvaltimokohtauksen ehkäisyssä
 - Jos saa oireita tietyssä rasituksessa, esimerkiksi ylämäessä tai pakkasessa ja tuulella, annostellaan kaksi Dinit-suihketta kielen päälle jo etukäteen
 - Jos oireita tulee päivittäin, on syytä keventää harjoitusta ja hakeutua lääkärin vastaanotolle

Nitro-suihke/ kielenalustabletti 2/2


- Kielenalustabletti eli resoribletti
- Glyseryylitrinitraatti laajentaa verisuonia ja keventää siten sydämen
Vaikutus alkaa 1 - 2 minuutin kuluessa ja kestää 10 - 30 minuuttia.
- Lääke on hyvä ottaa istuallaan tai makuuasennossa, sillä se alentaa verenpainetta ja saattaa aiheuttaa huimausta tai pyörtymisen.
- Jouduttaessa ottamaan lääkettä tihein väliajoin lääkkeen vaikutusteho voi heiketä -> lääkärin kanssa neuvottelu.

Lääkemääräys

- Burana 400mg 1x3
- Burana 400mg tarvittaessa
- Amorion 250mg 1x3, 7 vuorokauden ajan



Kun annat lääkkeit



Keskeiset lääkehoitoa ohjaavat säädökset

- Mitä ne ovat? Selvittääkää omissa ryhmissä.